

COMPLEMENT
A L'INVENTAIRE ICHTYOLOGIQUE
DE LA CAMARGUE

par Raymond LÉVÊQUE

Depuis notre première liste (*Terre et Vie*, 1957 : 231-240) un certain nombre de documents et renseignements sont venus amplifier nos connaissances sur les poissons de Camargue. Le manque de place nous oblige à ne donner que des renseignements aussi brefs que possible. Le territoire envisagé dans cette note reste, comme dans la première liste, la grande Camargue, c'est-à-dire le territoire situé entre la côte et les deux bras du Rhône.

Nous tenons à remercier ici tous ceux qui nous ont adressé leurs critiques et leurs suggestions à propos de notre premier travail, et qui nous ont soumis de nouvelles captures : MM. L. Hoffmann, P. Aguesse et M. Müller, de la Station biologique de la Tour du Valat, Monsieur Pierre Fluet d'Arles, le garde P. Juan au Vieux Rhône et M. Ch. Spillmann du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a bien voulu examiner la plupart de nos spécimens et nous conseiller dans les délicates questions de nomenclature.

Dans la liste ci-dessous, l'ordre adopté pour la séquence des familles est celui du *Traité de Zoologie*.

Alosa ficta rhodanensis Roule, Alose finte. Un exemplaire (125 mm de longueur standard) provenant de la pompe de Beauduc, 15 juillet 1957. Détermination Spillmann.

Clupea pilchardus Walbaum, Sardine. Nous avons revu 6 sujets du Vieux Rhône, le 1^{er} juillet 1957 (n° 27) ; deux du Jonquier du 30 septembre 1958 et trois de la Pompe de Beauduc du 6 août 1956. Détermination Spillmann.

Engraulis encrasicolus (L.), Anchois. Un sujet de 90 mm., pris dans le Vieux Rhône, le 23 avril 1957. Détermination Spillmann. (N° 23).

Salmo trutta L., Truite. Un sujet de 210 mm. pris dans le golfe de Beauduc le 17 juin 1961 (n° 31). Selon les pêcheurs, les truites se prennent régulièrement dans le Rhône jusqu'en mer, ainsi que sur la côte de Camargue.

Alburnus alburnus (L.), Ablette. Un sujet de 85 mm. pris à la Tour du Valat, le 27 août 1958. Détermination Spillmann (n° 26). Un de 112 mm. du Fumemorte, Valat, 14 avril 1959. Détermination Spillmann. Un troisième spécimen, de 85 mm., provenant de l'Aube de Bouic, Tour du Valat, 27 octobre 1957.

Belone belone (L.), plusieurs sujets du 30 septembre 1958, Jonquier (détermination Spillmann) ; deux du Vieux Rhône, 1^{er} juillet 1957 (n° 28) ; plusieurs spécimens (10 à 30 cm.) du canal d'entrée de l'étang de la Galère, 25 juillet 1957 ; un spécimen (50 cm.) au Grau de la Dent, 10 août 1957. Cette espèce est régulièrement présente, voire abondante, dans le Vieux Rhône, d'avril jusqu'à la fin de septembre.

Syngnathus acus L., Syngnathe. Un sujet de 180 mm. du Vieux Rhône, avril-mai 1957. Détermination Spillmann.

Mullus barbatus L., Rouget. Un sujet de 65 mm. provenant du canal d'entrée de l'étang de la Galère, 31 août 1957 (n° 21). Détermination Spillmann ; un second spécimen de 85 mm. provenant du Vieux Rhône, mi-septembre 1957. Détermination Spillmann.

Sargus annularis L. Un sujet de 82 mm. provenant de la pompe de Beauduc, 28 octobre 1958. Détermination Spillmann.

Sargus rondeleti C. et V. Quatre sujets du Vieux Rhône, mi-septembre 1957, détermination Spillmann, confirment l'identification du sujet pris précédemment (n° 1).

Chrysophrys aurata (L.), Daurade. Les sujets signalés sous le nom de *Pagrus pagrus* L. sont en réalité des *Chrysophrys aurata* (L.), comme me l'a fait remarquer Ch. Spillmann. En plus des deux sujets (n° 2 et 3) signalés précédemment, nous en possédons deux autres de 85 et 90 mm. capturés dans le Vieux Rhône, le 9 juillet 1957, et un troisième d'environ 120 mm. de la Capellière (!) du 2 septembre 1957. La pénétration en eaux saumâtres de cette espèce est très régulière en été.

Trachinus vipera C. et V., Vive. Un sujet de 83 mm. provenant de la pompe de Beauduc, le 28 octobre 1958. Détermination Spillmann. Un autre spécimen (n° 25) a été capturé au même endroit, le 26 juillet 1957.

Blennius sanguinolentus Pallas. Deux spécimens du Vieux Rhône, mi-septembre 1957. Détermination Spillmann.

Scomber scombrus L., Maquereau. Deux petits sujets des martellières du Vieux Rhône, mai 1958, (n° 30). Le maquereau est capturé au lancer à l'embouchure du Petit Rhône, comme j'ai pu le constater personnellement le 14 mai 1957. Certains spécimens remonteraient jusqu'à Port-Saint-Louis !

Gobius lota C. et V. Deux spécimens de 125 et 130 mm. du 2 et 7 juin 1957, Vieux Rhône. Détermination Spillmann (n° 19) ; un autre du Vieux Rhône, fin avril 1957. Détermination Spillmann.

Trigla hirundo L. Un spécimen de 185 mm. du vieux Rhône fin août 1957. Détermination Spillmann.

Aphya minuta (Risso). Deux sujets du Vieux Rhône, 1^{er} juin 1957. Détermination Spillmann.

Crenilabrus melops (L.). Un spécimen du Vieux Rhône, fin avril 1957. Détermination Spillmann.

Dicolocoglossa cuneata Moreau. Un spécimen de 98 mm. du Jonquier, 30 septembre 1958 (n° 32). Détermination Spillmann.

Solea vulgaris Quensel. Un sujet de 170 mm. du Vaccarès, 1^{er} septembre 1957 (n° 29). Détermination Spillmann. Les soles de Camargue semblent toutes appartenir à cette espèce.

Flesus flesus passer. D'après Ch. Spillmann il convient de rattacher à cette forme les sept sujets de Camargue qu'il a examiné. *Pleuronectes platessa* doit donc être rayé de la liste de 1957.

Raja montagui Fowler. Un spécimen (144 mm.) du Vieux Rhône, 23 avril 1957 (n° 24). Détermination Spillmann.

*Travail de la Station Biologique
de la Tour du Valat.*